ADVIK-5™

Emamectin Benzoate 5% SG
Systemic and Contact Insecticide

Emamectin benzoate 5% SG is a water soluble granular formulation containing 5% active ingredient and is used for the control of Bollworms on Cotton crop, Fruit & Shoot borer on Okra crop, DBM on Cabbage crop, Fruit borer, Thrips & Mites on Chilli crop, Fruit & Shoot borer on Brinjal crop, Pod borer on Red gram crop & Chickpea crop, Thrips on Grapes crop and Tea looper on Tea crop. It is an insecticide with stomach action and should be ingested by the larvae to be most effective. Affected larvae become paralyzed and stop feeding shortly after exposure to Emamectin Benzoate 5% SG and subsequently die after 2-4 days.

Chemical Composition :

Components Name	%w/w
Emamectin Benzoate a.i.	5.00 % w/w
Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate	7.50 % w/w
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	1.00 % w/w
Polydimethylsiloxane	0.10 % w/w
Lactose anhydrous	Q.S. % w/w
Total:	**100.00% w/w**

Dosage :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / HA A.I. (g.ai./ha)	Dosage / HA Formulation (g/ha)	Dilution in Water (ltr./ ha.)	Re-entry Period	Pre-Harvest Period
Grapes	Thrips	11.00	220.0	500-1000	24hrs	5
Red gram (Arhar/Tur)	Pod borer	11	220	500	24hrs	14
Cotton	Boll worms	9.5-11.0	190-220	500	24hrs	10
Chickpea	Pod borer	11	220	500	24hrs	14
Tea	Tea looper	10.00	200.0	500	24hrs	1
Cabbage	Diamond back moth	7.5-10.0	150-200	500	24hrs	3
Brinjal	Fruit and Shoot borer	10.00	200.0	500	24hrs	3
Okra	Fruit & Shoot Borer	6.75-8.50	135-170	500	24hrs	5
Chilli	Fruit borer, Thrips, Mites	10.00	200.0	500	24hrs	3

Good Practices relating to insecticide application techniques

Direction for use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. **Weather conditions:** 1. Spray when temperatures are low, avoid spraying in temperatures above 30°C. 2. Spray when relative humidity is high, do not spray when relative humidity is less than 40 per cent. 3. During the day, aim to spray when wind speed is more than 5km/h and up to 15km/h. Do not spray if wind is calm or less than 5km/h or at any wind speed where constancy in direction is not assured. If wind speed or direction changes during an application, immediately adjust the buffer size or location, or stop the application. **Soil and water:- Crop stage for application:** Boll formation stage. **Application technique:** Foliar spray. **Equipment Type:** Knapsack sprayer with hollow cone nozzle or power operated sprayer machine may be used. **Nozzle type:** Hollow cone nozzle.

Dosage: Given in the table above.

Instruction for mixing:- Re-entry Period: 24 hours. **Manner and Time of Application:- Application timings:** Morning or evening. **Frequency including maximum number of sprays:** 2-3.

Stages during which insecticide should not be applied on any crop:

Precaution to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests: Do not spray during active bee-foraging period of the day.

Symptoms of Poisoning: Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular in-coordination, ataxia and muscle tremors. Eye irritant.

First Aid: 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. **2. If inhaled:** Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. consult a physician. **3. In case of skin contact:** Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. **4. In case of eye contact:** Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain irritation, redness and photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote Statement: No specific antidote, symptomatic and supportive therapy. **Phytotoxity:** No.

Safety Precautions: Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

Instruction for Storage: 1. Store in a cool and dry place. 2. Store the insecticide in its original pack away from the reach of children, irresponsible persons and animals in a separate room under lock and key. 3. Room used for storage must be well built and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. 4. Animal feed should not be stored in room where the chemical is stored. 5. Do not use fire/ open flame in place of storage.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: DANGEROUS TO REUSE EMPTY CONTAINERS. 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Cautionary Statements: 1. Not to be used on crops and pests other than those mentioned on label and leaflets. 2. Destroy containers after use as directed on leaflets. 3. The product is toxic to aquaculture and honey bees.

अद्विक-5

ईमामेक्टिन बेंजोएट 5% एस.जी.
अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

ईमामेक्टिन बेंजोएट 5% एस.जी. पानी में घुलने वाले सूत्रीकरण है। जिसमे 5% सक्रिय तत्व मौजूद है, जिसका प्रयोग कपास की फसल में डोडे की सुंडियों, भिंडी की फसल में तना व फल छेदक इल्ली, पत्तागोभी की फसल में हीरक पतगें, मिर्च की फसल में फल छेदक, चुरदा व घुन, बैंगन की फसल में फल व तना छेदक, अरहर और चना की फसल में फली छेदक, अंगूर की फसल में थ्रिप्स और चाय की फसल में चाय का लूपर कीटों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए किया जाता है। यह कीटनाशक पेट में जाने पर असर दिखाता है और अच्छे नियंत्रण के लिए इसे इल्लियों के द्वारा खाना आवश्यक है। ईमामेक्टिन बेंजोएट के सम्पर्क होने पर, इल्लियाँ लक्वाग्रस्त हो जाती है और खाना बंद कर देती है तथा 2–4 दिनों में मर जाती है।

रासायनिक संरचना:

तत्व	%भार/भार
ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	5.00% भा/भा
सोडियम–एन–मिथाइल–एन–ओलियैल–टॉरेट	7.50% भा/भा
सोडियम एल्काइल नैफ्थालीन सल्फोनेट	1.00% भा/भा
पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन	0.10% भा/भा
लैक्टोज एनहाइड्रॅस	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग :	**100.00% भार/भार**

मात्रा :

फसलें	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्रा./है).	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्रा./है.)	पानी की मात्रा (ली./है.)	पुनः काल	पूर्व फसल
अंगूर	थ्रिप्स	11.00	220.0	500–1000	24घंटे	5
अरहर	फली छेदक	11	220	500	24घंटे	14
कपास	डोडे की सुंडिया	9.5–11.0	190–220	500	24घंटे	10
चना	फली छेदक	11	220	500	24घंटे	14
चाय	चाय का लूपर	10.00	200.0	500	24घंटे	1
पत्तागोभी	हीरक पतगें	7.5–10.0	150–200	500	24घंटे	3
बैंगन	फल व तना छेदक	10.0	200.0	500	24घंटे	3
भिंडी	तना व फल छेदक इल्ली	6.75–8.50	135–170	500	24घंटे	5
मिर्च	फल छेदक, चुरदा व घुन	10.00	200.0	500	24घंटे	3

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीको से संबंधित अच्छे अभ्यास

उपयोग के लिए दिशा निर्देश: उत्पाद की वांछित मात्रा को थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिलाइये। इसके बाद उपयुक्त स्प्रेयर के साथ फसल की कुल कवरेज के लिए पेष पानी की निर्दिष्ट मात्रा को भी आलोडन के रूप में अच्छी तरह से हिला–हिला कर मिला लीजिए। **मौसम की स्थिति:** 1. तापमान कम होने पर स्प्रे करें, 30 डिग्री C से ऊपर के तापमान में छिड़काव से बचें। 2. सापेक्ष आद्रता (नमी) अधिक होने पर स्प्रे करें, जब सापेक्ष आद्रता (नमी) 40 प्रतिशत से कम हो तो स्प्रे न करें। 3. दिन के दौरान, हवा की गति 5 किमी/घंटा और 15 किमी/घंटा से अधिक होने पर स्प्रे करने का लक्ष्य रखें। यदि हवा शांत हो या 5 किमी/घंटा से कम हो या किसी भी हवा की गति पर, जहां दिशा में गति का अश्वासन नहीं है, स्प्रे न करें। यदि किसी अनुप्रयोग के दौरान हवा की गति या दिशा बदलती है, तो तुरंत बाहर आकर या स्थान को समायोजित करें, या एप्लिकेशन को रोकें। **मिट्टी और पानी:– आवेदन के लिए फसल अवस्था:** बोलल फार्मेशन। **आवेदन तकनीक:** फोलिअर स्प्रे। **उपकरण प्रकार:** खोखले शंकु नोजल या पावर संचालित स्प्रेयर मशीन के साथ नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग किया जा सकता है। **नोजल प्रकार:** खोखला कोन नोजल।

मात्रा: उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

मिश्रण के लिए निर्देश:– पुनः प्रवेश की अवधि: 24 घंटें। **आवेदन का समय और रीति :– आवेदन का समय:** सुबह या शाम। **अधिक से अधिक अंक सहित आवृत्ति:** 2–3।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नही लगाया जाना चाहिए:–

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियाँ:–

विष के लक्षण: इस कीटनाशक से संपर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण हैं। पुतलियों का फैलना, असंतुलन, एटाक्सिया: लड़खड़ाना और मांशपेशियों में ऐठन होना। आंखों में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा: 1. **अगर मुँह से निगल लिया है:** यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी से मुँह कुल्ला कराये और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाए। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह से उल्टी न कराये। 2. **यदि साँस में लिऐ जाने पर:** रोगी को ताजी हवा में लें जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखे। यदि रोगी साँस नहीं ले पा रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। 3. **त्वचा के संपर्क के मामले में:** शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। 4. **आँखों के संपर्क के मामले में:** कम से कम 15 मिनिट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे–धीरे धोएं। यदि दर्द, जलन, लालीमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विषनाशक: कोई विशिष्ट विषहर औषध नहीं है, लाक्षणिक उपचार करें। रोगसूचक और सहायक चिकित्सा करें। **पादप आविषालुता:** नहीं।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ: छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिड़काव के बाद गंदे कपड़ों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह से धों लें। स्प्रे के धुएं को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें, कुछ न पिएं, खाएं व चबाएं।

संग्रहण की शर्तें: 1. ठंडे व शुष्क स्थान में भंडारण करें। 2. कीटनाशक को इसी के मूल पैकिंग में बच्चों, गैरजिम्मेदार व्यक्तियों व पशुओं की पहुंच ऐसे दूर, एक अलग कमरे में ताले के अंदर भंडारण करें। 3. भंडार अच्छा बना हुआ, हवादार तथा बड़े आकार का होना चाहिए ताकि वशपन द्वारा प्रदूषण न हो। 4. कीटनाशक के कमरे में पशुओं के आहार का भंडारण न करें। 5. भंडार के समीप आग आदि का प्रयोग न करें।

कीटनाशकों के प्रयोग किए गए डिब्बों, बचे हुए कीटनाशकों तथा डिब्बों के धोवन का निपटारा: 1. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की वह डिब्बों पैकेजेस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनो का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। 2. उपयोग किये गए खाली डिब्बों/पैकेजेस को बाहर न फेंके, जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सकें। 3. उपयोग किये गए खली डिब्बों/पैकेजेस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

सावधानियाँ कथन: 1. लेबल और पर्ची पर उल्लिखित फसलों के अलावा अन्य फसलों और कीटों पर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर (डिब्बों) को नष्ट कर दें। 3. यह उत्पाद मत्स्य पालन और मधुमक्खियों के लिए जहरीला है।

ऐडविक-५

ईमामेक्टिन बैंजोएट 5% ऐस.जी.
अंडवृष्टारी और मधमशी कीटनाशक

ईमामेक्टिन बैंजोएट 5% ऐस.जी पानी में घुलने वाले सूत्रीकरण है। जिस विचक्षण में 5% सक्रिय तत्व मौजूद है, जिसका प्रयोग कपास की फसल में डोडे की सुंडियों, भिंडी की फसल में तना व फल छेदक इल्ली, पत्तागोभी की फसल में हीरक पतगें, मिर्च की फसल में फल छेदक, चुरदा व घुन, बैंगन की फसल में फल व तना छेदक, अरहर और चना की फसल में फली छेदक, अंगूर की फसल में थ्रिप्स और चाय की फसल में चाय का लूपर कीटों की प्रभावशाली रोकथाम के लिए किया जाता है। यह कीटनाशक पेट में जाने पर असर दिखाता है और अच्छे नियंत्रण के लिए इसे इल्लियों के द्वारा खाना आवश्यक है। ईमामेक्टिन बेंजोएट के सम्पर्क होने पर, इल्लियाँ लक्वाग्रस्त हो जाती है और खाना बंद कर देती है तथा 2–4 दिनों में मर जाती है।

रासायनिक संरचना:

तत्व	% भार/भार
ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	5.00% भार/भार
सोडियम एन–मिथाईल–एन–ओलियल टॉरेट	7.50% भार/भार
सोडियम आल्काईल नेप्थालीन सल्फोनेट	1.00% भार/भार
पोलीडाय मिथाईल सिलोक्सिन	0.10% भार/भार
लैक्टोस ॲनहाईड्रस	पुरती मात्रा % भार/भार
कुल:	**100.00% भार/भार**

मात्रा:

पाकनुं नाम	जीवातनां सामान्य नाम	प्रति ऐक्टर मात्रा स. तत्व (ग्रा./ ऐक्टर)	प्रति ऐक्टर मात्रा संरचना (ग्रा./ ऐक्टर)	पाणीनी मात्रा (लीटर/ ऐक्टर)	पुनः प्रवेशनो समय	लणणी पहेलांनां समयगाळो
द्राक्ष	थ्रिप्स	11.00	220.0	500-1000	24 कलाक	5
तुवेर	पोड बोरर	11	220	500	24 कलाक	14
कपास	बोलवोर्म	9.5-11.0	190-220	500	24 कलाक	10
चणा	पोड बोरर	11	220	500	24 कलाक	14
चा	टी लुपर	10.00	200.0	500	24 कलाक	1
कोबीज़	डायमंड बेक मोथ	7.5-10.0	150-200	500	24 कलाक	3
रींगण	फ्रुट अने शूट बोरर	10.00	200.0	500	24 कलाक	3
भींडी	फ्रुट अने शूट बोरर	6.75-8.50	135-170	500	24 कलाक	5
मरचां	फ्रुट बोरर, थ्रिप्स अने माईट्स	10.00	200.0	500	24 कलाक	3

जंतुनाशकना उपयोगनी टेकनिक अंगे सारी प्रथा:

उपयोग माटेना निर्देश: ઉત્પાદનની જરૂરી માત્રા મુજબ માપ લઈ લો અને ઓછા પાણીમાં મરચાર ભેળવો. જરૂર મુજબ બાકીનું પાણી ઉમેરો અને હલાવો. પછી તેને યોગ્ય સ્પ્રેયર (છંટકાવ યંત્ર) વડે પાકમાં બરાબર છંટકાવ કરો. **હવામાનની સ્થિતિ:** 1. તાપમાન નીચું હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. 30 ડીગ્રી કરતાં ઊંચું તાપમાન હોય ત્યારે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. 2. વાતાવરણમાં સાપેક્ષ ભેજ વધારે હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. સાપેક્ષ ભેજ 40% થી ઓછો હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. 3. દિવસ દરમિયાન પવનની ગતિ કલાકના 5 કિ.મી. કરતાં વધારે હોય અને કલાકના 15 કિ.મી. કરતાં ઓછી હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. પવન શાંત હોય, તેની ગતિ 5 કિ.મી કરતાં ઓછી હોય અથવા પવનની દિશા સુનિશ્ચિત ન હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. આ ઉત્પાદનના છંટકાવ દરમિયાન પવનની ગતિ અને દિશા બદલાય તો, તુરંત બફરનું કદ અને સ્થાન સમાયોજિત કરો અથવા છંટકાવને રોકો. **જમીન અને પાણી:** **ઉપયોગ માટે પાકની અવસ્થા:** બોલ બનવાનો તબક્કો. **ઉપયોગની પદ્ધતિ:** પાન પર છંટકાવ. **ઉપકરણનો પ્રકાર:** હોલોકોન લગાડેલું નેપ્સેક સ્પ્રેયર અથવા પાવરથી ચાલતા સ્પ્રેયર મશીનનો ઉપયોગ કરી શકાય. **નોઝલનો પ્રકાર:** હોલોકોન નોઝલ.

ડોઝ: ઉલ્લામણ પત્રકમાં કર્યા જણાવ્યા અનુસાર.

મિશ્રણ માટેના નિર્દેશ: પુનઃ પ્રવેશનો સમય: 24 કલાક. **આવેદનનો સમય અને તેનો સમય:– ઉપયોગનો સમય:** સવારે અથવા સાંજના સમયે. **વદુમાં વધુ છંટકાવની આવૃત્તિ:** 2-3.

કોઈપણ પાક પર કયા તબક્કે જંતુનાશકનો છંટકાવ ન કરવો જોઈએ:–

મધમાખીઓ અને જીવાતના કુદરતી દુશ્મન જેવા ઉપયોગી જીવોને નુકસાન થતું અટકાવવા માટે રાખવાની સાવચેતીઓ: દિવસ દરમિયાન મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કરવા સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: આ જંતુનાશકના સંપર્કમાં આવવાથી દેખાતાં પ્રારંભિક લક્ષણો છે: આંખની પુતળીઓ ફેલાવી, સ્નાયુઓમાં અસંતુલન, એટાક્સિયા અને સ્નાયુઓ અકડાઈ જવા.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. **શ્વાસમાં અંદર જવું:** ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. **ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. 4. **આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

ઝેરનું મારણ: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો.

વિષાક્તતા: આ ઉત્પાદન ઝેરી નથી.

ઉપયોગ માટે સાવચેતી: મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે આપો શરીર પર સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરી લો. છંટકાવ પછી ગંદાં કપડાં અને શરીરના ખુલ્લા ભાગોને પાણીથી બરાબર ભેળવો. જરૂર મુજબ બાકીનું પાણી ઉમેરો અને હલાવો. પછી તેને યોગ્ય સ્પ્રેયર (છંટકાવ યંત્ર) વડે પાકમાં બરાબર છંટકાવ કરો. **હવામાનની સ્થિતિ:** 1. તાપમાન નીચું હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. 30 ડીગ્રી કરતાં ઊંચું તાપમાન હોય ત્યારે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. 2. વાતાવરણમાં સાપેક્ષ ભેજ વધારે હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. સાપેક્ષ ભેજ 40% થી ઓછો હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. 3. દિવસ દરમિયાન પવનની ગતિ કલાકના 5 કિ.મી કરતાં વધારે હોય અને કલાકના 15 કિ.મી. કરતાં ઓછી હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. પવન શાંત હોય, તેની ગતિ 5 કિ.મી કરતાં ઓછી હોય અથવા પવનની દિશા સુનિશ્ચિત ન હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. આ ઉત્પાદનના છંટકાવ દરમિયાન પવનની ગતિ અને દિશા બદલાય તો, તુરંત બફરનું કદ અને સ્થાન સમાયોજિત કરો અથવા છંટકાવને રોકો. **જમીન અને પાણી:** **ઉપયોગ માટે પાકની અવસ્થા:** બોલ બનવાનો તબક્કો. **ઉપયોગની પદ્ધતિ:** પાન પર છંટકાવ. **ઉપકરણનો પ્રકાર:** હોલોકોન લગાડેલું નેપ્સેક સ્પ્રેયર અથવા પાવરથી ચાલતા સ્પ્રેયર મશીનનો ઉપયોગ કરી શકાય. **નોઝલનો પ્રકાર:** હોલોકોન નોઝલ.

ડોઝ: ઉલ્લામણ પત્રકમાં કર્યા જણાવ્યા અનુસાર.

મિશ્રણ માટેના નિર્દેશ: પુનઃ પ્રવેશનો સમય: 24 કલાક. **આવેદનનો સમય અને તેનો સમય:– ઉપયોગનો સમય:** સવારે અથવા સાંજના સમયે. **વદુમાં વધુ છંટકાવની આવૃત્તિ:** 2-3.

કોઈપણ પાક પર કયા તબક્કે જંતુનાશકનો છંટકાવ ન કરવો જોઈએ:–

મધમાખીઓ અને જીવાતના કુદરતી દુશ્મન જેવા ઉપયોગી જીવોને નુકસાન થતું અટકાવવા માટે રાખવાની સાવચેતીઓ: દિવસ દરમિયાન મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કરવા સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: આ જંતુનાશકના સંપર્કમાં આવવાથી દેખાતાં પ્રારંભિક લક્ષણો છે: આંખની પુતળીઓ ફેલાવી, સ્નાયુઓમાં અસંતુલન, એટાક્સિયા અને સ્નાયુઓ અકડાઈ જવા.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. **શ્વાસમાં અંદર જવું:** ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. **ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. 4. **આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

ઝેરનું મારણ: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો.

વિષાક્તતા: આ ઉત્પાદન ઝેરી નથી.

ઉપયોગ માટે સાવચેતી: મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે આપો શરીર પર સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરી લો. છંટકાવ પછી ગંદાં કપડાં અને શરીરના ખુલ્લા ભાગોને પાણીથી બરાબર ભેળવો. જરૂર મુજબ બાકીનું પાણી ઉમેરો અને હલાવો. પછી તેને યોગ્ય સ્પ્રેયર (છંટકાવ યંત્ર) વડે પાકમાં બરાબર છંટકાવ કરો. **હવામાનની સ્થિતિ:** 1. તાપમાન નીચું હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. 30 ડીગ્રી કરતાં ઊંચું તાપમાન હોય ત્યારે છંટકાવ કરવાનું ટાળો. 2. વાતાવરણમાં સાપેક્ષ ભેજ વધારે હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. સાપેક્ષ ભેજ 40% થી ઓછો હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. 3. દિવસ દરમિયાન પવનની ગતિ કલાકના 5 કિ.મી કરતાં વધારે હોય અને કલાકના 15 કિ.મી. કરતાં ઓછી હોય ત્યારે છંટકાવ કરો. પવન શાંત હોય, તેની ગતિ 5 કિ.મી કરતાં ઓછી હોય અથવા પવનની દિશા સુનિશ્ચિત ન હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં. આ ઉત્પાદનના છંટકાવ દરમિયાન પવનની ગતિ અને દિશા બદલાય તો, તુરંત બફરનું કદ અને સ્થાન સમાયોજિત કરો અથવા છંટકાવને રોકો. **જમીન અને પાણી:** **ઉપયોગ માટે પાકની અવસ્થા:** બોલ બનવાનો તબક્કો. **ઉપયોગની પદ્ધતિ:** પાન પર છંટકાવ. **ઉપકરણનો પ્રકાર:** હોલોકોન લગાડેલું નેપ્સેક સ્પ્રેયર અથવા પાવરથી ચાલતા સ્પ્રેયર મશીનનો ઉપયોગ કરી શકાય. **નોઝલનો પ્રકાર:** હોલોકોન નોઝલ.

ડોઝ: ઉલ્લામણ પત્રકમાં કર્યા જણાવ્યા અનુસાર.

મિશ્રણ માટેના નિર્દેશ: પુનઃ પ્રવેશનો સમય: 24 કલાક. **આવેદનનો સમય અને તેનો સમય:– ઉપયોગનો સમય:** સવારે અથવા સાંજના સમયે. **વદુમાં વધુ છંટકાવની આવૃત્તિ:** 2-3.

કોઈપણ પાક પર કયા તબક્કે જંતુનાશકનો છંટકાવ ન કરવો જોઈએ:–

મધમાખીઓ અને જીવાતના કુદરતી દુશ્મન જેવા ઉપયોગી જીવોને નુકસાન થતું અટકાવવા માટે રાખવાની સાવચેતીઓ: દિવસ દરમિયાન મધમાખીઓ ખોરાક એકઠો કરવા સક્રિય હોય ત્યારે છંટકાવ કરશો નહીં.

ઝેરનાં લક્ષણો: આ જંતુનાશકના સંપર્કમાં આવવાથી દેખાતાં પ્રારંભિક લક્ષણો છે: આંખની પુતળીઓ ફેલાવી, સ્નાયુઓમાં અસંતુલન, એટાક્સિયા અને સ્નાયુઓ અકડાઈ જવા.

પ્રાથમિક સારવાર: 1. ગળવું: ડૉક્ટર દ્વારા કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરાવવી નહીં. બેભાન વ્યક્તિને કંઈ ન આપો પાણીથી મોં સાફ કરો, જો દર્દી સભાન હોય તો પીવા માટે 1-2 ગ્લાસ પાણી આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 2. **શ્વાસમાં અંદર જવું:** ભોગ બનનારને તાજી હવામાં લઈ જાવ અને તેને ગરમ અને શાંત સ્થિતિમાં રાખો. જો શ્વાસ લેવાતો ન હોય અથવા શ્વસન કરવું મુશ્કેલ હોય તો મોઢા દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ આપવો અથવા ઓક્સિજન આપો. તરત જ તબીબી સારવાર મેળવો. 3. **ચામડીને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** માથાના વાળ અને આંગળીઓના નાખની નીચે સહિત શરીરના પ્રદૂષિત ભાગોને સાબુ વડે બરાબર ધોઈ નાખો. જો દુખાવો, લાલ ચકામાં કે બળતરા ચાલુ રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો. પ્રદૂષિત કપડાંને અલગ કરી દો અને ફરી ઉપયોગ પહેલાં તેને સાબુ તથા ભરપૂર પાણીથી અલગ-અલગ ધુઓ. 4. **આંખોને સ્પર્શ થયો હોય ત્યારે:** 15 મિનિટ સુધી આંખોને હળવેથી ધુઓ. જો દુખાવો, બળતરા અને લાલ ચકામાં કે ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.

ઝેરનું મારણ: કોઈ વિશિષ્ટ વિષનાશક નથી. લક્ષણો પ્રમાણે ઉપચાર આપો.

વિષાક્તતા: આ ઉત્પાદન ઝેરી નથી.

ઉપયોગ માટે સાવચેતી: મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે આપો શરીર પર સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રો પહેરી લો. છંટકાવ પછી ગંદાં કપડાં અને શરીરના ખુલ્લા ભાગોને પાણીથી બરાબર ધોઈ નાખો. આ ઉત્પાદન શ્વાસમાં ન જાય તેનું ધ્યાન રાખો. છંટકાવ દરમિયાન કશું ખાશો, પીશો, ચાવશો કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં.

સંગ્રહ માટે સૂચના: 1. ઠંડી અને સૂકી જગ્યામાં સંગ્રહ કરો. 2. જંતુનાશકને તેના મૂળ પેકિંગમાં બાળકો, બેજવાબદાર વ્યક્તિઓ અને પશુઓની પહોંચથી દૂર અલગ રૂમમાં તાળાવાળીમાં રાખો. 3. આ ઉત્પાદનના સંગ્રહ માટેનો રૂમ યોગ્ય રીતે બનાવેલા, હવા ઊજાસવાળો અને મોટો હોવો જોઈએ. જેથી બાષ્પ દ્વારા પ્રદૂષણ ટાળી શકાય. 4. જંતુનાશકનો સંગ્રહ કર્યા હોય તે રૂમમાં પશુઆહારનો સંગ્રહ ન કરવો જોઈએ. 5. સંગ્રહ કર્યા હોય તે રૂમમાં આગ/જ્વાળા ન કરવી જોઈએ.

ઉપયોગમાં લેવાયેલ કંટેનર, ઉપકરણમાંના ધોવાણ અને બચેલી સામગ્રીનો નિકાલ: "ખાલી કંટેનર (ડબ્બા)ને ફરીથી ઉપયોગ જોખમી છે.'' 1. આ જંતુનાશકના નિર્માતા અને વપરાશકારની એ ફરજ છે કે ખાલી ડબ્બાઓ/વધેલ જંતુનાશકના છંટકાવનાં સાધનોના ધોવાણવાળા પાણીનો સુરક્ષિત નિકાલ કરે કે જેથી વાતાવરણ પ્રદૂષિત ન થાય. 2. ઉપયોગ કરેલા ખાલી ડબ્બા/પેકેજોને ફરીવાર ઉપયોગ ન થાય એ માટે તેને બ

అడ్వీక్-5

ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 శాతం ఎస్‌జి
అంతర్వ్యాహి మరియు స్పర్శనీయమైన కీటకనాశిని

ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 శాతం ఎస్‌జి సీలింపే కణికలు గింజల సూత్రీకరణ. దీనిలో 5 శాతం సక్రియ పదార్థం ఉంది. ప్రేరిత ఆకలితో బోల్‌వర్మ్, బెండకాయ ఆకులితో పండు మరియు చిగురిస్తూ తొలిదశ పురుగు, కాబేజీపై ఆకులితో తిప్పిన, మిరపకాయ ఆకులితో పండుపై తొలిదశ పురుగు, థ్రిప్స్ మరియు చెదలు, బంతాయిని ఆకులితో పండు మరియు చిగుళ్ళపై తొలిదశ పురుగు, బత్తాణి ఎర్ర నారంగిని ఆకులితో కాయపై తొలిదశ పురుగు. దాక్షిణ ఆకులితో థ్రిప్స్ మరియు తేయాకుపై ఆకులితో టీ లూపర్‌పై నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది. కేసుపులో చర్యను కలిగించే కీటకనాశిని ఇది. అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉండటానికి లార్వా దీన్ని తినాలి. ప్రభావానికి గుర్తిస్తే లార్వా పక్షవాతానికి గురవుతుంది మరియు ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 శాతం ఎస్‌జి ఎక్కువ తరువాత తరువాత వెంటనే ఫీడింగ్ ఆపివేస్తుంది మరియు 2-4 రోజుల తరువాత మరణిస్తుంది.

ఉపయోగ మోతాదు:

పదార్థం	శాతం భాగాలు
ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ ఎ.ఐ.	5.00 శాతం భాగాలు
సోడియం ఎస్-సిమెథైల్-ఎస్ఎ లిరియేల్-టారెట్	7.50 శాతం భాగాలు
సోడియం లిగ్నిన్ సల్ఫోనేట్	1.00 శాతం భాగాలు
పాలీథైనుథైల్ సిలోక్సేన్	0.10 శాతం భాగాలు
లాక్టోజ్ ఎస్‌క్యూఎస్	క్యూ.ఎస్. శాతం భాగాలు
మొత్తం:	100.00 శాతం భాగాలు

మోతాదు:

పంట పేరు	కీటకాల సాధారణ పేరు	మోతాదు/హెక్టారు ఏ. ఐ. (గ్రా./హెక్టారు)	మోతాదు/హెక్టారు సూత్రీకరణ (గ్రా./హెక్టారు)	నీటిలో విడదీయడం (లీ./హెక్టారు)	తిరిగి ప్రవేశించే వ్యవధి	థ్రి-హార్వెస్ట్ టైంటైర్వల్
క్రాకులు	థ్రిప్స్	11.00	220.0	500-1000	24 గంటలు	5
ఎర్ర నారంగి	కాయపై తొలిదశ పురుగు	11	220	500	24 గంటలు	14
ట్రిక్కి	బోల్‌వర్మ్స్	9.5-11.0	190-220	500	24 గంటలు	10
బఠాణీ	కాయపై తొలిదశ పురుగు	11	220	500	24 గంటలు	14
తేయాకు	టీ లూపర్	10.00	200.0	500	24 గంటలు	1
కాబేజీ	డైమండ్ బ్యాక్ మాత్	7.5-10.0	150-200	500	24 గంటలు	3
వంకాయ	పండు మరియు చిగుళ్ళపై తొలిదశ పురుగు	10.00	200.0	500	24 గంటలు	3
భిండి	పండు మరియు చిగుళ్ళపై తొలిదశ పురుగు	6.75-8.50	135-170	500	24 గంటలు	5
మిర్చి	పండు మరియు చిగుళ్ళపై తొలిదశ పురుగు, థ్రిప్స్, చెదలు	10.00	200.0	500	24 గంటలు	3

కీటకనాశిని ఉపయోగించే విత్తన్నులకు సంబంధించిన మంచి పద్ధతులు:

ఉపయోగించడానికి మార్గదర్శకం: ఉత్పత్తి యొక్క కాలవ్యవధి కొలవండి మరియు కొలిచిన వెయిట్ బాగా కలపండి. పంట పూర్తిగా కవర్ అవ్వడానికి ఆమోదించిన స్ప్రేయర్‌లో బాగా కలపడం ద్వారా నిర్దేశించిన విధంగా తక్కిన నీటి పరిమాణాన్ని చేర్చండి. నాణ్యతలేని పదార్థాలు: ఆకులు పై పొరపై కవర్ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి, 30 సెం. కంటే అధికంగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయడం నివారించాలి. 2. సాపేక్ష తేమ ఆధికంగా ఉన్నప్పుడు, పిచికారీ చేయాలి, సాపేక్ష తేమ 40 శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయడం. 3. రోజులో, గాలి వేగం 5 కిమీ/గంటకు కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు 15కిమీ/గంటకు వరకు ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేసే లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉండండి. గాలి ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు లేదా 5 కిమీ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు/గంటకు లేదా గాలి దిశే దిశలో ఎదైనా కలిగి ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. ఉపయోగించే సమయంలో గాలి వేగం లేదా దిశ మారినట్లయితే వెంటనే ఖర్చు పెరుగుతాయి లేదా గోళీల్లో నిర్లక్ష్యం చేయండి లేదా ఉపయోగించడం ఆపివేయండి. మళ్లీ మరియు నీరు- ఉపయోగించడానికి 5 లీటర్ దగ్గర ఎర్రటి దగ్గ. ఉపయోగించే విత్తన్నులు: ఇతరులు పెంచిన పొలాలు లేదా పొలాలు ఫలితాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఉపయోగించే విత్తన్నుల పరిమాణం: 2 కిలోలు/హెక్టారు. ఆకస్మికంగా ఉపయోగించడం: ఇతరులు పెంచిన పొలాలు లేదా పొలాలు ఫలితాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఉపయోగించే సమయంలో గాలి వేగం లేదా దిశ మారినట్లయితే వెంటనే ఖర్చు పెరుగుతాయి లేదా గోళీల్లో నిర్లక్ష్యం చేయండి లేదా ఉపయోగించడం ఆపివేయండి. మళ్లీ మరియు నీరు- ఉపయోగించడానికి 5 లీటర్ దగ్గ. ఉపయోగించే విత్తన్నులు: ఆకులు పై పొరపై కవర్ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. సామర్థ్యం కలిగి బోల్ కోస్ నాణ్యతలో పిచికారీ చేయడం. ఉపయోగించే సమయంలో గాలి వేగం లేదా దిశ మారినట్లయితే వెంటనే ఖర్చు పెరుగుతాయి లేదా గోళీల్లో నిర్లక్ష్యం చేయండి లేదా ఉపయోగించడం ఆపివేయండి. మళ్లీ మరియు నీరు- ఉపయోగించడానికి 5 లీటర్ దగ్గ. ఉపయోగించే విత్తన్నులు: ఆకులు పై పొరపై కవర్ ఉన్నప్పుడు పిచికారీ చేయాలి. సామర్థ్యం కలిగి బోల్ కోస్ నాణ్యతలో పిచికారీ చేయడం.

అట్‌విక్-5

ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్.జి.
ఉల్లరభుణ మర్రుమ్ తొంటుర్గుళ్ళ పూశీచికొల్లలి మరుస్తు

ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్‌జి కణికల సూత్రీకరణ కలిగి ఉన్నది. దీనిలో 5% క్రియాశీల పదార్థం ఉంది. ప్రేరిత ఆకలితో బోల్‌వర్మ్, బెండకాయ ఆకులితో పండు మరియు చిగురిస్తూ తొలిదశ పురుగు, కాబేజీపై ఆకులితో తిప్పిన, మిరపకాయ ఆకులితో పండుపై తొలిదశ పురుగు, థ్రిప్స్ మరియు చెదలు, బంతాయిని ఆకులితో పండు మరియు చిగుళ్ళపై తొలిదశ పురుగు, బత్తాణి ఎర్ర నారంగిని ఆకులితో కాయపై తొలిదశ పురుగు. దాక్షిణ ఆకులితో థ్రిప్స్ మరియు తేయాకుపై ఆకులితో టీ లూపర్‌పై నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది. కేసుపులో చర్యను కలిగించే కీటకనాశిని ఇది. అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉండటానికి లార్వా దీన్ని తినాలి. ప్రభావానికి గుర్తిస్తే లార్వా పక్షవాతానికి గురవుతుంది మరియు ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 శాతం ఎస్‌జి ఎక్కువ తరువాత తరువాత వెంటనే తినడం ఆపివేస్తుంది మరియు 2-4 రోజుల తరువాత మరణిస్తుంది.

రసాయన కూర్పు:

పాకశుద్ధకాలిన పెయర్‌కాలే	% వి/వి
ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ ఎ.ఐ.	5.00% వి/వి
సోడియం లిగ్నో-సిమ్మెథాల్ -లిగ్నో - ఇథిలుఅల్టెంట్రేట్	7.50% వి/వి
సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్	1.00% వి/వి
పాలిఇథిలీన్ గ్లైకోల్	0.10% వి/వి
లాక్టోస్ అణ్యాల్యూలర్	QS % వి/వి
మొత్తం:	**100.00% వి/వి**

టూల్:

పంట (బళ్ళ)	పూశీచికలిన పెయర్	టూల్/ఇథ్ ఎ.ఐ. (గ్రా/ఎ)	మార్కెటింగ్ ఫార్ములేషన్ (గ్రా/ఎ)	నీటిలో కలగలపు (లీ/ఎ)	అప్లికేషన్ టైమింగ్	అప్లికేషన్ సంఖ్య
థ్రిగాట్‌సా	థ్రిప్స్	11.00	220.0	500-1000	24 మణిలోస్	5
ఖుమారా	విత్తనపుటాకు తుణ్ణపుటాకు	11	220	500	24 మణిలోస్	14
పత్రుతి	కాయపుటాకు	9.5-11.0	190-220	500	24 మణిలోస్	10
పట్టాణి	విత్తనపుటాకు తుణ్ణపుటాకు	11	220	500	24 మణిలోస్	14
ఢేకేలేలు	ఇ ఇ ఇ ఎస్	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	1
గుడ్డాలు-పిచ్చి-కుక్కలు	వైరాయ్రత్తుకు పూశీరి	7.5-10.0	150-200	500	24 మణిలోస్	3
కత్తిరి	పూశుం మర్రుమ్ పూశుం గుర్రుత్తుకు తుణ్ణపుటాకు	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	3
వెండ్లాడ	పూశుం మర్రుమ్ పూశుం గుర్రుత్తుకు తుణ్ణపుటాకు	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	3
మిణాకాయ్	పూశుం తుణ్ణపుటాకు, థ్రిప్స్ తుణ్ణపుటాకు	6.75-8.50	135-170	500	24 మణిలోస్	5
మిర్చి	పూశుం తుణ్ణపుటాకు, థ్రిప్స్ తుణ్ణపుటాకు, చెదలు	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	3

పూశీచికొల్లలి మరుస్తు యుపయోగిస్తుంది నలిన మురుకుతుకు:

యుపయోగిస్తుత యోగదలకుతు: దేహలయాన అణవు మర్రుకత్తు అణుస్తు ఎస్తుస్తు. శిస్తుతువు తణ్ణణోర్గుట్టు. కణ్ణిలుగుట్టు ఇమ్మర్రుకు కణ్ణయుర్కుటు. కుర్రిపిట్ట అణలిలు మీత్రిపుటాల తణ్ణణోర్గుట్టు ఊర్రిస్తు నణ్రూరాక్కు కలుక్కి చెరుత్తుతూన సంచియోర్పు కొనణ్ణు పరిగ్రహిస్తుంది పుర్రువుత్తు ఎస్తుస్తు. **వాణిలిలు కిలలలలు:** 1. వెయిస్తులిలు కుణ్ణలాన కిస్తుతుంది పొదు తుణ్ణవుతు. 30 ఇ.కిలో శిక్కు కిలో వెయ్యిస్తు కిస్తుతుతు కిస్తుతు పుయోస్తుతు ఇక్కుతు పుయోస్తుతుతుక్కు తణ్ణిర్కుతుతు. 2. పుర్రుకుతు అణ్కిలాన కిస్తుతుతు కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 3. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 4. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 5. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 6. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 7. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 8. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 9. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 10. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 11. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 12. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 13. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 14. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 15. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 16. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 17. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 18. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 19. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 20. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 21. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 22. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 23. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 24. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 25. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 26. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 27. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 28. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 29. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 30. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 31. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 32. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 33. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 34. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 35. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 36. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 37. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 38. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 39. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 40. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 41. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 42. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 43. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 44. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 45. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 46. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 47. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 48. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 49. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 50. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 51. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 52. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 53. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 54. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 55. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 56. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 57. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 58. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 59. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 60. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 61. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 62. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 63. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 64. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 65. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 66. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 67. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 68. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 69. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 70. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 71. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 72. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 73. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 74. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 75. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 76. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 77. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 78. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 79. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 80. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 81. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 82. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 83. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 84. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 85. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 86. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 87. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 88. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 89. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 90. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 91. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 92. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 93. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 94. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 95. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 96. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 97. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 98. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 99. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు. 100. కిస్తుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు పుయోస్తుతు పుర్రుకుతు కిస్తుతుతు.

అఝిక్-5

ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% SG
అంతర్వాహి మట్టు సంపర్క కీటనాశక

ఇమ్మామ్మక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% SG సీలింపె కణికలుయొక్క సూత్రీకరణ. దీనిలో 5% క్రియాశీల పదార్థం ఉంది. ప్రేరిత ఆకలితో బోల్‌వర్మ్, బెండకాయ ఆకులితో పండు మరియు చిగురిస్తూ తొలిదశ పురుగు, కాబేజీపై ఆకులితో తిప్పిన, మిరపకాయ ఆకులితో పండుపై తొలిదశ పురుగు, థ్రిప్స్ మరియు చెదలు, బంతాయిని ఆకులితో పండు మరియు చిగుళ్ళపై తొలిదశ పురుగు, బత్తాణి ఎర్ర నారంగిని ఆకులితో కాయపై తొలిదశ పురుగు. దాక్షిణ ఆకులితో థ్రిప్స్ మరియు తేయాకుపై ఆకులితో టీ లూపర్‌పై నియంత్రించడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది. కేసుపులో చర్యను కలిగించే కీటకనాశిని ఇది. అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉండటానికి లార్వా దీన్ని తినాలి. ప్రభావానికి గుర్తిస్తే లార్వా పక్షవాతానికి గురవుతుంది మరియు ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5 శాతం ఎస్‌జి ఎక్కువ తరువాత తరువాత వెంటనే తినడం ఆపివేస్తుంది మరియు 2-4 రోజుల తరువాత మరణిస్తుంది.

రసాయనిక సూత్రీకరణలే:

పదార్థగాగల పేరుకు	% వి/వి
ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ ఎ.ఐ.	5.00% వి/వి
సోడియం ఎస్-సిమెథైల్-ఎస్ఎ లిరియేల్-టారెట్	7.50% వి/వి
సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్	1.00% వి/వి
పాలిఇథిలీన్ గ్లైకోల్	0.10% వి/వి
లాక్టోస్ అణ్యాల్యూలర్	Q.S. % వి/వి
ఆకుల:	**100.00% వి/వి**

ఇంజెక్షన్:

పక్షి (కిలో)	ప్రాణాలకుల కొలతాయాన పేరు	ఇంజెక్షన్/ఎ ఎ.ఇ. (మిలియన్/ఎ)	సూక్ష్మీకరణ (గ్రా/ఎ)	నీరు (లీటర్/ఎ)	మందుప్రదేశ ఆవరి	కీటకాల్లో ఆవరి
ఖుమారి	ఇబ్రహిమ్	11.00	220.0	500-1000	24 మణిలోస్	5
ఖుమార	ఖొంబాగుతుకలతో	11	220	500	24 మణిలోస్	14
పత్రుతి	ఖొంబాగుతుకలతో	9.5-11.0	190-220	500	24 మణిలోస్	10
వెబ్బుకలకు	ఖొంబాగుతుకలతో	11	220	500	24 మణిలోస్	14
ఢేకేలు	ఇ ఇ ఇ ఎస్	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	1
కాంబుగుడ్	పూగాయి	7.5-10.0	150-200	500	24 మణిలోస్	3
వాళ్ళుతు	వైరాయ్రత్తుకు ఇబ్బరం	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	3
వెబ్బ	కాయ తుణ్ణపుటాకు నాగుపు తుణ్ణపుటాకు	6.75-8.50	135-170	500	24 మణిలోస్	5
వుణ్ణక్	కాయ తుణ్ణపుటాకు, ఇబ్బరంగ్ తుణ్ణపుటాకు	10.00	200.0	500	24 మణిలోస్	3

కీటనాశిని ప్రభావం యొక్కయాయలుణ్ణుపుకొని బాయిపడ్డ నల్ల శీలలుణ్ణు:

ఉపయోగపడుతున్నదా గుర్తించండి: ఆగువుకాయ తొంతిలో కుమ్రిగొనుగిలి అణ్ణలెనుకున్నగా తీరిన కుగాయ్ వెణ్ణుకు అతిలో చెలికెన్నుకు. ఒక్క ఉగాయ్ అల్లకుకిలో ౧౫౧౫ ప్రుపయోగిస్తే నాగాయి ణ్ణుణ్ణుకుకొన్నుగాయి అణ్ణలో ఇక్కుకుకు. **కాలవ్యవధి సూచనలణ్ణు:** 1. తొంగలిలు కుగాయుకొకుకుకుకుకుకు సుప్రేలు చెయ్యుకు, 30 C కలిగి తయుకిలు తొంగలిలుణ్ణుకుకుకుకుకుకుకు సుప్రేలు చెయ్యుగాయ్ ఉగాయ్‌కుకు. 2. తుణ్ణుకుకుకు ఆర్ద్రత ఉణ్ణగిలిలుణ్ణుకుకుకుకుకుకు సుప్రేలు చెయ్యుగాయ్. తుణ్ణుకుకుకు ఆర్ద్రత 40 శతాంశాగాయుకుకు కుగాయ్‌కుకుకుకుకుకుకు సుప్రేలు చెయ్యుగాయ్. 3. పకతి సూర్యరశ్మి కుగిలిన్ ఉగాయ్ కుకుకుకుకుకు 5 కిలో/గ కి కుకుకుకుకు 15 కిలో/గ వరకుయు ఆగుతికిలుణ్ణుకుకుకుకుకు సుప్రేలు చెయ్యుగాయ్ ప్రభావితుకు. కుగిలిలుణ్ణుకుకుకుకుకుకు కుగిలిన్ ఉగాయ్ కుకుకుకుకుకు 4. ఇగా ఉగాయుగాయ్ సుప్రేలుకుకుగాయ్ ఉగాయ్‌కుకుకుకుకుకుకు సుప్రేలు చెయ్యుగాయ్ ఉగాయ్‌కుకుకుకుకుకుకు కుగిలిన్ ఉగాయ్ కుకుకుకుకుకు కుగిలిన్ ఉగాయ్ కుకుకుకుకుకు. **ప్రభావం కనిపిస్తుంది:** ఇలుపకర్లతో తణ్ణికుకుకుకుకుకు. **ఉపయోగపడుతుంది:** ఇలుపకర్లతో తణ్ణికుకుకుకుకుకుకు. **ఉపయోగపడుతుంది:** ఇలుపకర్లతో తణ్ణికుకుకుక